

# Miskolci Egyetem Doktori (PhD) Tézisfüzetei



GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

## A MAXIMUM OPERÁTOR SZEREPE A MÉRHETŐSÉGELMÉLETBEN ÉS NÉHÁNY ALKALMAZÁS

PhD értekezés

KÉSZÍTETTE:

**AGBEKO KWAMI NUTEFE**

OKLEVELES MATEMATIKUS

HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

DOKTORI ISKOLA VEZETŐ:

**Prof. Dr. Tóth Tibor**

A MŰSZAKI TUDOMÁNY DOKTORA

TUDOMÁNYOS VEZETŐ:

**Vadászné Bognár Gabriella dr. habil**

A MATEMATIKAI TUDOMÁNY KANDIDÁTUSA

Miskolc, 2009

# 1. Bevezetés és néhány jelölés

Egy adott  $(\Omega, \mathcal{F})$  mérhető téren a  $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  halmazfüggvények közül a  $\sigma$ -additív mérték (vagyis a valószínűségi mérték) a legjobban kutatott területet teszi ki (lásd Halmos P.R. [21]). Az utóbbi évtizedekben az ún. fuzzy mérték is napvilágot látott, melynek axiómái sajnos nem egységesek úgy mint a hagyományos mértéknél azt megszoktuk (lásd Sugeno M. és Murofushi T. [38], valamint Dubois D. [19]).

A disszertációm célja a maximum (szupremum) operátor tanulmányozása.

a) Megvizsgáljuk a maximum operátort a  $\sigma$ -algebrákon, azaz tetszőleges  $\sigma$ -algebrán definiáljuk az ún. optimális mértéket, amely bizonyos feltételeknek eleget tesz.

b) Tanulmányozzuk a maximum operátort a mérhető függvények halmazán.

A dolgozat hét részből áll. Az *I.* fejezet a legfontosabb fogalmak rövid bevezetését és történeti leírását tartalmazza. A *II.* fejezetben definiáljuk az ún. optimális mértéket és megfogalmazzuk a struktúratételt. A *III.* fejezet ismerteti egy injektív leképezés létezését, amely a mérhető halmazokhoz optimális mértékek halmazait rendeli. Majd megadunk egy szükséges és elégséges feltételt, hogy a leképezés szürjektív legyen. A *IV.* fejezetben a Lebesgue integrálnak megfelelően bevezetjük az ún. optimális átlagot. Ezzel kapcsolatos tulajdonságok áttekintése után a Fubini illetve a Radon-Nikodym tételeknek a mértékelméletbeli megfelelőjét írjuk fel. Az *V.* fejezetben az optimális mérték és az optimális átlag felhasználásával jellemzünk néhány jól ismert konvergencia tételt mint például stabilizálódó, egy sorozat szerint pontonkénti, egyenletes ill., pontonkénti konvergencia tételt. A *VI.* fejezetben valószínűség számítási eszközökkel a konkáv ill. konvex Young függvényekkel kapcsolatos maximális egyenlőtlenségeket fogalmazzunk meg. A konkáv Young függvények halmazából egy sűrű valódi részhalmazt különítünk el és megadjuk a pozitív fixponttal rendelkező összes konkáv Young függvények halmazát. A *VII.* fejezetben az optimális mérték alkalmazásait és egy a konkáv Young függvények pozitív fixpontjával kapcsolatos algoritmust mutatunk be.

## Jelölések:

1.) A maximum, illetve szupremum operátorokra  $\bigvee$  és  $\vee$  jelöléseket használjuk. Hasonlóan  $\bigwedge$  és  $\wedge$  szimbólumok a minimumot, illetve az infimumot jelölik.

2.) Az  $(\Omega, \mathcal{F})$  pár tetszőleges mérhető teret jelöl, ahol  $\Omega$  tetszőleges nem-üres halmaz és  $\mathcal{F}$  az  $\Omega$  halmaz részhalmazainak egy  $\sigma$ -algebrája.

3.)  $\mathcal{P}$ -vel az optimális mértékek halmazát jelöljük.

4.)  $\mathcal{P}_{<\infty}$  az olyan optimális mértékek halmazát jelöli, melyek véges generáló rendszerrel rendelkeznek.

5.)  $\mathcal{P}_{\infty}$  az olyan optimális mértékek halmazát jelöli, melyek megszámlálhatóan végtelen generáló rendszerrel rendelkeznek.

## 2. Az optimális mérték és a struktúratétel

### 1. Tézis:

A  $\sigma$ -additív mértékhez (vagy valószínűségi mértékhez) hasonlóan egy az ún. optimális mértéket vezetünk be, azaz egy olyan halmazfüggvényt, mely egy tetszőleges  $\sigma$ -algebrát a  $[0, 1]$  intervallumba képezi le. Az optimális mérték tulajdonságai közül kiemelhető a monotonitás és a felülről való folytonosság. Beláttuk, hogy tetszőleges optimális mértékhez van olyan felbonthatatlan atomok véges vagy megszámlálhatóan végtelen tagú sorozata, mely generálja azt, vagyis az optimális mértékek strukturális tulajdonságúak.

### 2.1. Az optimális mérték: definíció, példák

**2.1. Definíció (Agbeko, [5], 1994).** A  $p : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  halmazfüggvényt optimális mértéknek nevezzük, ha:

**2.1. Axióma.** Teljesül a  $p(\Omega) = 1$  és  $p(\emptyset) = 0$  azonosság.

**2.2. Axióma.** Minden  $B$  és  $E$  mérhető halmaz esetén a

$$p(B \cup E) = p(B) \vee p(E)$$

azonosság fennáll.

**2.3. Axióma.** Minden  $(E_n) \subset \mathcal{F}$  csökkenő eseménysorozat esetén

$$p\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} p(E_n) = \bigwedge_{n=1}^{\infty} p(E_n),$$

azaz a  $p$  halmazfüggvény felülről folytonos.

Megemlítjük, hogy a következő tulajdonság fontosnak bizonyul a későbbiekben.

**2.1. Lemma (Agbeko, [5], 1994).** Legyen  $(B_n) \subset \mathcal{F}$ ,  $B_n \uparrow B$  és  $p$  egy optimális mérték. Akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p(B_n) = p(B).$$

**2.1. Példa (Agbeko, [5], 1994).** Legyen  $(\Omega, \mathcal{F})$  tetszőleges mérhető tér,  $(\omega_n) \subset \Omega$  tetszőleges fix sorozat és  $(\alpha_n) \subset [0, 1]$  egy adott számsorozat, melyre  $\alpha_n \downarrow 0$ . Akkor a  $p : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ ,

$$p(B) = \max\{\alpha_n : \omega_n \in B\}, \quad (1)$$

halmazfüggvény egy optimális mérték.

Továbbá, ha  $\Omega = [0, 1]$  és  $\mathcal{F}$  egy Borel halmazokat tartalmazó  $\sigma$ -algebra a  $[0, 1]$  fölött, akkor az  $\mathcal{F}$ -en definiált bármely optimális mérték megadható az (1) szerinti alakban.

Megemlítem, hogy a fenti példát Laczkovich Miklós adta.

**2.2. Példa (Agbeko, [5], 1994).** Legyen  $(\Omega, \mathcal{F})$  tetszőleges mérhető tér és  $\omega \in \Omega$  egy rögzített elem. Definiáljunk egy  $p_\omega : \mathcal{F} \rightarrow \{0, 1\}$  halmazfüggvényt az alábbi módon:  $p_\omega(B) = 1$ , ha  $\omega \in B$ , és  $p_\omega(B) = 0$  egyébként. Akkor a  $p_\omega$  halmazfüggvény is egy optimális mérték.

## 2.2. A struktúratétel

**2.2. Definíció (Agbeko, [5], 1994).** Legyen  $p$  egy optimális mérték. Egy  $H, p(H) > 0$  mérhető halmazt  $p$ -atomnak nevezünk, ha abból, hogy  $B \in \mathcal{F}$  és  $B \subset H$  következik, hogy  $p(B) = p(H)$ , vagy  $p(B) = 0$ .

**2.3. Definíció (Agbeko, [5], 1994).** Legyen  $H$  egy  $p$ -atom. Azt mondjuk, hogy a  $H$  atom felbontható, ha létezik egy szub-atom (részatom)  $B \subset H$  úgy, hogy  $p(B) = p(H) = p(H \setminus B)$ . Ha nincs ilyen szub-atom, akkor a  $H$  atomot felbonthatatlannak nevezzük.

**Struktúratétel.** Legyen az  $(\Omega, \mathcal{F})$  mérhető tér és a  $p$  optimális mérték tetszőleges. Akkor létezik páronként diszjunkt felbonthatatlan  $p$ -atomok egy

$$\mathcal{H}(p) = \{H_n : n \in J\}$$

rendszere, ahol  $J$  véges vagy megszámlálhatóan végtelen indexhalmaz úgy, hogy minden  $B \in \mathcal{F}, p(B) > 0$  esetén

$$p(B) = \max \{p(B \cap H_n) : n \in J\}. \quad (2)$$

Továbbá, ha a  $J$  indexhalmaz megszámlálhatóan végtelen, akkor  $0$  az egyetlen torlódási pontja a

$$\{p(H_n) : n \in J\}$$

halmaznak, amelyet generáló rendszernek nevezünk.

## 3. Az optimális átlag

### 2. Tézis:

A Lebesgue integrál (vagy a várható érték) mintájára definiálunk egy nem-lineáris funkcionált (ún. optimális átlagot) nem-negatív mérhető lépcsős függvények esetén. Először beláttuk, hogy ez az átlag nem függ a lépcsős függvény felbontásától, majd azt, hogy tetszőleges nem-negatív korlátos mérhető függvény esetén a függvény feletti lépcsős függvények optimális átlagának infimuma megegyezik a függvény alatti nem-negatív lépcsős függvények optimális átlagának szupremumával. Kiterjesztettük az optimális átlagot tetszőleges nem-negatív mérhető függvényekre és így megkaptuk a Fubini, illetve Radon-Nikodym tételek a mértékelméletbeli megfelelőjét.

Legyen

$$s = \sum_{i=1}^n b_i \chi(B_i)$$

nem-negatív mérhető lépcsős függvény, ahol  $\{B_i : i = 1, \dots, n\} \subset \mathcal{F}$  az  $\Omega$  alaphalmaznak egy partíciója és  $(\Omega, \mathcal{F})$  egy mérhető tér.

Az  $s$  lépcsős függvény Lebesgue integrálját és optimális átlagát az alábbi táblázatban összegezzük:

Az $s$ Lebesgue integrálja:	Az $s$ optimális átlaga (Agbeko, [5], 1994)
$\int_{\Omega} s d\mu := \sum_{k=1}^n b_k \mu(B_k)$	$\int_{\Omega} s dp := \bigvee_{i=1}^n b_i p(B_i),$

**3.1. Tétel (Agbeko, [5], 1994).** *Legyen egy  $s \geq 0$  lépcsős függvénynek két felbontása*

$$\sum_{i=1}^n b_i \chi(B_i) \quad \text{és} \quad \sum_{k=1}^m c_k \chi(C_k),$$

ahol  $\{B_i : i = 1, \dots, n\}$  és  $\{C_k : k = 1, \dots, m\} \subset \mathcal{F}$  az  $\Omega$  alaphalmaz két partíciója. Akkor

$$\bigvee_{i=1}^n b_i p(B_i) = \bigvee_{k=1}^m c_k p(C_k).$$

**3.1. Állítás.** *Legyen  $f \geq 0$  egy korlátos mérhető függvény. Akkor*

$$\sup_{s \leq f} \int_{\Omega} s dp = \inf_{\bar{s} \geq f} \int_{\Omega} \bar{s} dp,$$

ahol  $s$  és  $\bar{s}$  nem-negatív mérhető lépcsős függvényeket jelöl.

**3.1. Definíció (Agbeko, [5], 1994).** *Legyen  $f$  egy tetszőleges mérhető függvény. Az  $f$  optimális átlagán az*

$$\int_{\Omega} |f| dp = \sup \int_{\Omega} s dp$$

mennyiséget értjük, ahol a szupremumot azokon az  $s$  nem-negatív mérhető lépcsős függvényeken vesszük, melyekre igaz, hogy  $s \leq |f|$ .

Az optimális mértékek atomos struktúrájának egyik jelentős következményét az alábbi két eredményben foglaljuk össze:

**3.2. Állítás (Agbeko, [6], 1995).** *Bármely  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  nem-negatív mérhető függvény minden felbonthatatlan atomon majdnem mindenütt konstans értéket vesz fel.*

**3.3. Állítás (Agbeko, [6], 1995).** *Legyen adott egy  $p \in \mathcal{P}$  optimális mérték és egy  $f$  mérhető függvény. Akkor*

$$\int_{\Omega} |f| dp = \sup \left\{ \int_{H_n} |f| dp : n \in J \right\},$$

ahol  $\mathcal{H}(p) = \{H_n : n \in J\}$  egy  $p$ -generáló rendszer.

Továbbá, ha

$$\int_{\Omega} |f| dp < \infty$$

feltétel fennáll, akkor

$$\int_{\Omega} |f| dp = \sup \{c_n \cdot p(H_n) : n \in J\},$$

ahol  $c_n = f(\omega)$  majdnem minden  $\omega \in H_n$ ,  $n \in J$  esetén.

## 4. A mérhető függvényekkel kapcsolatos konvergenciatételek és korlátosság

### 3. Tézis:

Az optimális mérték, valamint optimális átlag felhasználásával jellemzünk számos jól ismert konvergenciatételt a mérhető függvénysorozatok esetén: a stabilizálódó (discrete), egy sorozat szerint pontonkénti (equally), egyenletes (uniform), valamint a pontonkénti (pointwise) konvergenciatételeket. Kitérünk a mérhető függvénysorozatok különféle korlátosságának jellemzésére is az optimális átlag alkalmazásával.

**4.1. Definíció (Császár Á. és Laczkovich M., [16]-[18]).** Legyen  $X$  egy tetszőleges nem-üres halmaz. Azt mondjuk, hogy az  $X$ -en definiált  $(h_n)$  valós értékű függvénysorozat konvergál egy  $h$  valós értékű függvényhez:

a) "stabilizálódóan", ha minden  $x \in X$  esetén létezik olyan  $n_0(x)$  egy küszöb index, hogy

$$h_n(x) = h(x),$$

ha  $n > n_0(x)$ ;

b) "egy sorozat szerint pontonként", ha van egy olyan  $(b_n)$  pozitív nullához tartó számsorozat és tetszőleges  $x \in X$  elemhez van olyan  $n_0(x)$  küszöb index, hogy

$$|h_n(x) - h(x)| < b_n,$$

ha  $n > n_0(x)$ .

**4.1. Tétel (Agbeko, [7], 2000).** Legyenek adottak  $f$  és  $f_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) mérhető függvények. Ahhoz, hogy az  $(f_n)$  függvénysorozat egyenletesen tartson  $f$ -hez, szükséges és elégséges feltétel, hogy a  $(z_n)$  függvénysorozat a nullához tartson egyenletesen a  $\mathcal{P}_\infty$  halmazon, ahol

$$z_n(p) = \int_{\Omega} |f_n - f| dp,$$

$n \in \mathbb{N}$ ,  $p \in \mathcal{P}_\infty$ .

**4.2. Tétel (Agbeko, [7], 2000).** Legyenek adottak  $f$  és  $f_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) mérhető függvények. Ahhoz, hogy az  $(f_n)$  függvénysorozat pontonként (stabilizálódóan, egy-sorozat szerint pontonként) tartson  $f$ -hez, szükséges és elégséges feltétel, hogy a  $(z_n)$  függvénysorozat pontonként (stabilizálódóan, egy-sorozat szerint pontonként) konvergáljon 0-hoz a  $\mathcal{P}_{<\infty}$  halmazon, ahol

$$z_n(p) = \int_{\Omega} |f_n - f| dp,$$

$n \in \mathbb{N}$ ,  $p \in \mathcal{P}_{<\infty}$ .

## 5. A valószínűségszámítási eszközökkel kapcsolatos maximális egyenlőtlenségek

### 4. Tézis:

Áttekintjük a konkáv (konvex) Young függvényekkel kapcsolatos maximális egyenlőtlenségeket valószínűségszámítási eszközökkel. Elkülönítjük az  $\mathcal{Y}_{\text{conc}}$  konkáv Young függvények halmazának egy  $\mathfrak{A}$  részhalmazát, mely a kompozícióra zárt. Megadunk az  $\mathcal{Y}_{\text{conc}}$  halmazon egy olyan metrikát, mely szerint az  $\mathfrak{A}$  részhalmaz sűrű az  $\mathcal{Y}_{\text{conc}}$  halmazban. Megadjuk a pozitív fixponttal rendelkező összes konkáv Young függvények halmazát.

### 5.1. Szubmartingálokkal kapcsolatos maximális egyenlőtlenségek

**5.1. Definíció.** A  $\Phi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  függvényt konkáv Young függvénynek nevezzük, ha minden  $x \geq 0$  esetén

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(t) dt,$$

ahol  $\Phi(0) = 0$  és  $\varphi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  csökkenő, jobbról folytonos függvény, mely integrálható minden véges  $(0, x)$  intervallumon. Továbbá feltesszük, hogy  $\Phi(\infty) = \infty$ . Az összes ilyen konkáv Young függvények halmazát az  $\mathcal{Y}_{\text{conc}}$ -cal jelöljük.

**5.2. Definíció.** Azt mondjuk, hogy a  $\Phi$  konkáv Young függvény teljesíti a maximális egyenlőtlenséget, ha létezik olyan  $K_\Phi > 0$  (csak  $\Phi$ -től függő) konstans, hogy minden  $(X_n, \mathcal{F}_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$  nem-negatív szubmartingál esetén az

$$E\Phi(X_n^*) \leq K_\Phi(1 + EX_n) \quad (3)$$

egyenlőtlenség teljesül minden  $n \in \mathbb{N}$ -re, ahol  $X_n^* = \bigvee_{k=1}^n X_k$ .

**5.1. Tétel (Agbeko, [3], 1989).** Legyen  $\Phi$  egy konkáv Young függvény. Ahhoz, hogy a  $\Phi$  függvény teljesítse a fenti maximális egyenlőtlenséget szükséges és elégséges feltétel, hogy

$$A_\Phi := \int_1^\infty \frac{\varphi(t)}{t} dt < \infty. \quad (4)$$

### 5.2. Konkáv Young függvények fixpontjáról

Fixpontról az első tanulmány az 1912-ben jelentet meg Brouwertól (lásd [14]).

**5.2. Tétel (Brouwer, [14]).** Ha  $D^n$  egy zárt egységsugarú gömb, akkor minden  $f : D^n \rightarrow D^n$  folytonos függvény esetén, van olyan  $x$  pont  $D^n$ -ben, hogy  $x = f(x)$ .

A fixponttételnek különböző formája van. Mindegyikre nem szándékozom kitérni; egy ilyen tétel például a kontrakciós elven alapuló fixponttétel. Megemlítem Mészáros J.

kollégámnak egy nagyon szép dolgozatát, ahol különböző kontrakciós elveket kötött össze [27].

Brouwer tételének egy igen elegáns illusztrációja a következő (lásd [http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2004/08/kakutani\\_is\\_at...html](http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2004/08/kakutani_is_at...html)).

”Egy reggel, pontosan a napkeltekor, egy Buddhista szerzetes útnak indult egy kis csillogó templomba, mely egy hegy csúcsán található. Egy keskeny ösvény kigyózva vezet a hegy mentén a templomhoz. A szerzetes változó sebességgel ment fel, többször is megállt pihenni és enni. Kicsivel a napnyugta előtt elérte a templomot. Több napos böjtölés és meditáció után szintén a napkeltekor visszafelé indult ugyanazon az ösvényen, megint változó sebességgel haladt sok pihenéssel. Az átlagsebessége lefelé természetesen nagyobb mint, amikor felment. Kérdés, hogy van-e az út mentén olyan pont, ahová azonos időpontban ér el mindkét irányból?”

A feladatnak intuitív megoldása a következő: ”Képzeljünk el két szerzetest, egyik a templomból lefelé, a másik a kolostorból felfelé indul el ugyan a napon és a napkeltekor. Biztosan van olyan pont ahol találkoznak.”

A Brouwer-féle fixpont tétel garantálja egy ilyen pont létezését.

**5.3. Tétel (Agbeko, [11], 2008).** *Legyen  $\Phi \in \mathcal{Y}_{\text{conc}}$  tetszőleges függvény. Ahhoz, hogy létezzen egy olyan  $s > 0$  szám, melyre  $\varphi(s) < 1$  fennáll szükséges és elégséges feltétel, hogy a  $\Phi$  függvény rendelkezzen egy fixponttal, azaz  $x = \Phi(x)$  fennálljon valamilyen  $x > 0$  szám esetén.*

**5.1. Állítás (Agbeko, [11], 2008).** *Legyen  $\Phi \in \mathcal{Y}_{\text{conc}}$  tetszőleges függvény. Ha  $x_0 \in (0, \infty)$  egy olyan szám, hogy  $\Phi(x_0) = x_0$ , akkor  $\varphi(x_0) < 1$ .*

## 6. Alkalmazások

### 6.1. Az optimális mérték adatokból való meghatározása

#### 6.1.1. Előzmények

A fuzzy halmazelméletben problémaként merült fel, hogy hogyan lehet meghatározni empirikusan a fuzzy mértéket. Wang Z., Leung K.S. és Wang J. (valamint sokan mások) javasolták a Sugeno-féle integrál használatát erre a célra (lásd [40]). A Sugeno integrált úgyszólván lehet tekinteni mint több-bemenő és egy kimenő rendszernek. A bemenet egy  $(f(\omega_1), \dots, f(\omega_n))$  vektor és a kimenet

$$E := (S) \int f d\mu = \sup \{ \alpha \wedge \mu(F_\alpha) : \alpha \in [0, 1] \},$$

ahol  $f$  egy ismeretlen mérhető függvény,  $\mu$  egy ismeretlen fuzzy mérték az  $(\Omega, \mathcal{F})$  mérhető téren és  $F_\alpha := \{ \omega \in \Omega : f(\omega) \geq \alpha \}$ .

Megfigyeljük  $k$ -szor az  $(f(\omega_1), \dots, f(\omega_n))$  rendszert, melynek eredménye:



$f_1(\omega_1)$	$f_1(\omega_2)$	$\dots$	$f_1(\omega_n)$	$E_1$
$f_2(\omega_1)$	$f_2(\omega_2)$	$\dots$	$f_2(\omega_n)$	$E_2$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$f_k(\omega_1)$	$f_k(\omega_2)$	$\dots$	$f_k(\omega_n)$	$E_k$

és keressünk azt a  $\mu$  közelítő fuzzy mértéket, melyre  $E_i = (S) \int f_i d\mu$ , ( $i = 1, \dots, k$ ), és amely minimalizálja az

$$e := \sqrt{\sum_{i=1}^k \left( E_i - (S) \int f_i d\mu \right)^2} \quad (5)$$

kifejezést.

Megemlítem, hogy a fenti (5) minimál feladatot az ún. genetikus algoritmus felhasználásával oldották meg, amelynek több inputja és egy outputja van [25].

### 6.1.2. Az optimális mérték adatokból való meghatározása

A Wang Z. és társainak dolgozata mintájára fogalmazzuk meg az alábbi problémát:

**1. Probléma.** Legyen  $(\Omega, \mathcal{F})$  egy mérhető tér, ahol  $\Omega = \{1, \dots, n\}$  és  $\mathcal{F} = 2^\Omega$ , azaz  $\mathcal{F}$  az  $\Omega$  alaphalmaznak hatványhalmaza. Tekintsük a  $B_1 := \{1\}, \dots, B_n := \{n\}$  egyelemű halmazokat és legyen  $f : \Omega \rightarrow [0, \infty)$  egy mérhető függvény, melynek értékkészlete csak elméleti értéket tartalmaz. Megfigyeljük  $k$ -szor az  $f(1), \dots, f(k)$  elméleti értékeket, melynek eredménye:

$B_1$	$B_2$	$\dots$	$B_n$	
$f_1(1)$	$f_1(2)$	$\dots$	$f_1(n)$	$Q_1$
$f_2(1)$	$f_2(2)$	$\dots$	$f_2(n)$	$Q_2$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$f_k(1)$	$f_k(2)$	$\dots$	$f_k(n)$	$Q_k$

ahol  $Q_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f_{ij}$ ,  $f_{ij} := f_i(j)$ , ( $j = 1, \dots, n$ ;  $i = 1, \dots, k$ ).

A kérdés az, hogy a  $k$  számú "minta" közül, mely tekinthető a legjobbnak a mintaátlag szempontjából?

Ennek a problémának megoldására javasolom, hogy keressünk egy  $p$  elméleti optimális mértéket, melyre fennáll  $Q_i \approx \int_{\Omega} f_i dp$ , ( $i = 1, \dots, k$ ), úgy, hogy

$$err := \sqrt{\sum_{i=1}^k \varepsilon_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^k \left( Q_i - \int_{\Omega} f_i dp \right)^2} \quad (6)$$

minimális legyen. Nyilvánvalóan a fent említett elméleti optimális mérték közelítését csak szimulációval lehet meghatározni. Legyen  $p_*$  az az optimális mérték, mely minimalizálja az (6) kifejezést. Könnyen be lehet látni, hogy

$$\bigvee_{i=1}^k \left| Q_i - \int_{\Omega} f_i dp_* \right| < err.$$

Legyen  $i_0$  az az index, mely esetén a maximum elérhető volt, azaz

$$\left| Q_{i_0} - \int_{\Omega} f_{i_0} dp_* \right| = \bigvee_{i=1}^k \left| Q_i - \int_{\Omega} f_i dp_* \right|.$$

Ekkor azt mondhatjuk, hogy a  $p_*$  optimális mérték mellett az  $i_0$ -adik minta a legjobb a mintaátlag szempontjából.

Megemlítem, hogy a statisztikai mezők alaphalmaza általában nem számértékekből vagy számvektorokból áll. Ezért fogalmazzuk meg az alábbi általános problémát. Majd rámutatjuk, hogyan lehet az első problémának megoldását felhasználni az általános probléma megoldására.

**2. Probléma.** Legyen  $(X, \mathcal{S})$  egy tetszőleges mérhető tér és a  $D_1, \dots, D_n$  halmazok az  $X$  halmaz egy partícióját alkotják. Tekintsük a  $h : X \rightarrow [0, \infty)$  egy valószínűségi változó. Megfigyeljük  $k$ -szor a  $h$  elméleti függvényt a  $D_1, \dots, D_n$  partíción. A megfigyelés eredménye:

$D_1$	$D_2$	$\dots$	$D_n$	
$h_{11}$	$h_{12}$	$\dots$	$h_{1n}$	$Q_1$
$h_{21}$	$h_{22}$	$\dots$	$h_{2n}$	$Q_2$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
$h_{k1}$	$h_{k2}$	$\dots$	$h_{kn}$	$Q_k$

ahol  $h_{ij}$  a  $h$  függvény megfigyelt értéke az  $i$ -edik kísérletnél a  $D_j$  halmazon,  $i = 1, \dots, k$ ;  $j = 1, \dots, n$ , és  $Q_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n h_{ij}$ ,  $i = 1, \dots, k$ .

A kérdés az, hogy a  $k$  számú "minta" közül, mely tekinthető a legjobbnak a mintaátlag szempontjából?

A 2. problémát az elsőre vezetjük vissza az alábbi módon:

Vegyük az  $\mathcal{S}_0 := \sigma(D_1, \dots, D_n)$  a  $D_1, \dots, D_n$  partíció által generált véges  $\sigma$ -algebrát. Nyilvánvaló, hogy a  $h$  függvény  $\mathcal{S}_0$ -mérhető és legalább egy bijekció létesíthető az  $\mathcal{S}_0$  és a  $2^\Omega$  halmazok között, ahol  $\Omega = \{1, \dots, n\}$ . Ezután tekintünk egy  $f : \Omega \rightarrow [0, \infty)$  mérhető függvényt, melynek megfigyelt értékei:  $f_i(j) := h_{ij}$ ,  $i = 1, \dots, k$ ;  $j = 1, \dots, n$ . Innentől úgy járunk el mint az első problémánál láttuk.

AZ ELSŐ PROBLÉMAT MEGOLDÓ ALGORITMUS

**Step 0.**

**Input:**  $n$  positive integer  
 $\Omega = \{1, \dots, n\}$   
 $k \times n$  matrix  $F = [f(i, j)]_{i,j=1}^{n, k}$   
 $n$ -dimensional vector  $Q$   
error bound  $\varepsilon$   
 $B_j = \{j\}, j = 1 \dots n$   
 $X$  = the power set of  $\Omega$  whose elements should be indexed  $k = 1 \dots 2^n$   
Generate the set  $\sigma$  of all permutations of  $\{1, \dots, n\}$ .

**Step 1.**

Generate a decreasing sequence  $\alpha(j) \in (0, 1]$ , with  $\alpha(1) = 1$ .

**Step 2.**

For any permutation  $\{n_1, \dots, n_n\} \in \sigma$   
Put  $p(B_j) = \alpha(n_j)$ , for  $j = 1, \dots, n$   
Compute the optimal average:  $A(i) = \max\{f(i, j) * p(B_j) : j = 1 \dots n\}$   
Compute the corresponding error:  $err = \sqrt{\left(\sum_{j=1}^n (Q(i) - A(i))\right)^2}$

**Step 3.**

If  $err < \varepsilon$  for some permutation do  
Find the index  $i_0$  such that  $|Q(i_0) - A(i_0)| = \max\{|Q(i) - A(i)| : i = 1 \dots k\}$   
Determine  $p(B) = \max\{\alpha(n_j) : j \in B\}$ , for each  $B \in X$   
Else GOTO **Step 1**

**Step 4.**

**The outputs**

- 1.) **Best sample:**  $f(i_0, 1), \dots, f(i_0, n)$
- 2.) **The approximated optimal measure:**

$2^\Omega$	$p(B)$
$\{\} := \emptyset$	0
$B_1$	$p(B_1)$
$\vdots$	$\vdots$
$B_i$	$p(B_i)$
$\vdots$	$\vdots$

## 6.2. A kontrakciós fok és a pozitív fixpont keresésének algorit-musa

**Step 1.** Input  $\Phi(x)$ ,  $cc > 0$ .

**Step 2.** Compute the derivative  $\varphi(x)$  of  $\Phi(x)$

**Step 3.** Starting from  $cc$  find an approximation root for equation  $\varphi(x) - 1 = 0$  and put the result into  $c$ .

**Step 4.** *If*  $c = 0$  *then* STOP.  
*else do*

**Step 5.** Starting from  $c$  apply the FixedPoint algorithm, i.e.  
 $x_0 := c$ ;  $x_{k+1} := \Phi(x_k)$ ;  $k = k + 1$ .

## 7. Dolgozataimra hivatkozó munkák listája

- [1] I. FAZEKAS, A note on "optimal measures", Publ. Math. Debrecen **51** / 3-4 (1997), 273-277. (**Paper referred to:** Publ. Math. Debrecen **46** / **1-2** (1995), 79-87)
- [2] I. FAZEKAS, A note on "optimal measures", Publ. Math. Debrecen **51** / 3-4 (1997), 273-277. (**Paper referred to:** Acta Math. Hung. **63** (**1-2**) (1994), 1-15.)
- [3] TASOS C. CHRISTOFIDES, Maximal inequalities for N-demimartingales, Archives Ineq. Applic. 1(2003), 397 - 408. (**Paper referred to:** Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Math. **29** (1986), 9-17)
- [4] B.L.S. PRAKASA RAO, On some maximal inequalities for demisubmartingales and N-demisuper martingales, J. Inequal. Pure and Appl. Math. **8**(2006), Issue 4, Art.112, pp. 17 [ONLINE: <http://jipam.vu.edu.au/>] (**Paper referred to:** Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Math. **29** (1986), 9-17)
- [5] YU MIAO AND GUANGYU YANG, A note on the upper bounds for the dispersion, J. Inequal. Pure and Appl. Math. **8**(2007), Issue 3, Art.83, 17 pp. 6. [ONLINE: <http://jipam.vu.edu.au/>] (**Paper referred to:** Inequal. Pure and Appl. Math. **7**(5) (2006), Art.186. [ONLINE: <http://jipam.vu.edu.au/>])

A disszertációm témájához kapcsolódó publikációm az Irodalomjegyzékben az 1–11-ig terjedő munkákban szerepelnek.

## Hivatkozások

- [1] N. K. Agbeko, *Some reverse maximal inequalities for supermartingales*, Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Comput. **6** (1985), 49–54.
- [2] N. K. Agbeko, *Concave function inequalities for sub- (super-) martingales*, Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Math. **29** (1986), 9–17.
- [3] N. K. Agbeko, *Necessary and sufficient condition for the maximal inequality of concave Young-functions*, Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Math. **32** (1989), 267–270.
- [4] N. K. Agbeko, *On an inequality of Longnecker and Serfling*, Analysis Math. **17** (1991), 3–9.
- [5] N. K. Agbeko, *On optimal averages*, Acta Math. Hung. **63** (1-2) (1994), 1–15.
- [6] N. K. Agbeko, *On the structure of optimal measures and some of its applications*, Publ. Math. Debrecen **46/1-2** (1995), 79–87.
- [7] N. K. Agbeko, *How to characterize some properties of measurable functions*, Math. Notes, Miskolc **1/2** (2000), 87–98.
- [8] N. K. Agbeko, *Mapping bijectively  $\sigma$ -algebras onto power sets*, Math. Notes, Miskolc **2/2** (2001), 85–92.
- [9] N. K. Agbeko, *Studies on concave Young-functions*, Miskolc Math. Notes **6/1** (2005), 3–18.
- [10] N. K. Agbeko, *Some p.d.f.-free upper bound for the dispersion  $\sigma(X)$  and the quantity  $\sigma^2(X) + (x - EX)^2$* , J. Inequal. Pure and Appl. Math. **7**(5) (2006), Art.186. [ONLINE: <http://jipam.vu.edu.au/>]
- [11] N. K. Agbeko, *The class of concave Young-functions possessing a positive fixed point*, Miskolc Math. Notes **9** (2008), No. 1, pp. 3-6.

- [12] R. ASH, *Real analysis and probability theory*, Acad. Press, New York, London (1972).
- [13] N. S. BARNETT, P. CERONE, S. S. DRAGOMIR AND J. ROUMELIOTIS, *Some inequalities for the dispersion of a random variable whose pdf is defined on a finite interval*, J. Inequal. Pure and Appl. Math., **2**(1)(2001), Art. 1. [ONLINE: <http://jipam.vu.edu.au>]
- [14] L. E. J. BROUWER, *Über Abbildungen von Mannigfaltigkeiten*, Math. Ann., **71**(1912), 97–115.
- [15] TASOS C. CHRISTOFIDES, *Maximal inequalities for  $N$ -demimartingales*, Archives Ineq. Applic. **1**(2003), 397 - 408.
- [16] Á. CSÁSZÁR AND M. LACZKOVICH, *Discrete and equal convergence*, Studia Sci. Math. Hung. **10**(1975), 463–472.
- [17] Á. CSÁSZÁR AND M. LACZKOVICH, *Some remarks on discrete Baire classes*, Acta Math. Acad. Sci. Hung. **33** (1-2)(1979), 51–70.
- [18] Á. CSÁSZÁR AND M. LACZKOVICH, *Discrete and equal Baire classes*, Acta Math. Hung. **55**(1-2) (1990), 165–178.
- [19] D. DUBOIS, *Théorie des possibilités*, Masson, Paris, 1985. ISBN: 2-225–80579-2
- [20] I. FAZEKAS, *A note on "optimal measures"*, Publ. Math. Debrecen **51/3-4** (1997), 273–277.
- [21] P. R. HALMOS, *Measure theory*, D. van Nostrand Co. Inc. 4<sup>th</sup> ed., 1956.
- [22] SHIZUO KAKUTANI, *A generalization of Brouwer's fixed point theorem*, Duke Mathematical Journal **8**(3)(1941), 457-459.
- [23] J. KENNAN, *Uniqueness of positive fixed points for increasing concave functions on  $\mathbb{R}^n$ : An elementary result*, Review of Economic Dynamics **4**(2001), 893-899.
- [24] M. A. KRASNOSEL'SKI AND B. YA RUTICKII, *Convex functions and Orlicz-spaces*. (Transl. from Russian by BORON L. F.) Noordhoff, Groningen, 1961.
- [25] C. C. LIN AND A. P. CHEN, *Fuzzy discriminant analysis with outlier detection by genetic algorithm*, Computer & Operation Research **31** (2004), 877-888.
- [26] M. LONGNECKER AND R. J. SERFLYING, *General moment and probability inequalities for the maximum partial sum*, Acta Math. Acad. Sci. Hung. **30** (1977), 129–133.
- [27] J. MÉSZÁROS, *A comparison of various definitions of contractive type mappings*, Bull. Cal. Math. Soc. **84**(1992), 167-194.
- [28] YU MIAO AND GUANGYU YANG, *A note on the upper bounds for the dispersion*, J. Inequal. Pure and Appl. Math., **8**(3)(2007), Art. 83 [ONLINE: <http://jipam.vu.edu.au/>].

- [29] J. MOGYORÓDI, *On the decomposition of Doob of non-negative submartingales*, Ann. Univ. Sci. Budapest, Sectio Math. **24** (1981), 255–264.
- [30] J. MOGYORÓDI AND T. F. MÓRI, *Necessary and sufficient condition for the maximal inequality of convex Young functions*, Acta Sci. Math. Szeged **45** (1983), 325–332.
- [31] J. MOGYORÓDI, *On a concave Young function inequality for martingales*, Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio Math. **24** (1981), 265–271.
- [32] J. F. NASH, JR., *Equilibrium Points in N-Person Games*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **36**(1950) 48–49.
- [33] B.L.S. PRAKASA RAO, *On some maximal inequalities fo demisubmartingales and N-demisupermartingales*, J. Inequal. Pure and. Appl. Math., 8(4)(2007), Art. 112. [ONLINE: <http://jipam.vu.edu.au/>].
- [34] M. PURI AND D. RALESCU, *A possibility measure is not a fuzzy measure*, Fuzzy Sets and Systems, **7**(1982), 311-313.
- [35] M. C. REED, *Fundamental Ideas of Analysis*, John Wiley and Sons Inc., New York, Singapore, 1998.
- [36] W. RUDIN, *Principles of mathematical analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill Book Company, Auckland, 1976.
- [37] J. SERFLING, *Moment inequality for the maximum cumulative sum*, Ann. Math. Statist. **41** (1970), 1227–1234.
- [38] M. SUGENO AND T. MUROFUSHI, *Pseudo-additive measures and integrals*, J. Math. Anal. Appl. **122**(1987), **no. 1**, 197-222.
- [39] A. TARSKI, *A lattice-theoretical Fixpoint Theorem and its applications*, Pacific Journal of Mathematics **5**(1955), 285-309.
- [40] Z. WANG, K.-S. LEUNG AND J. WANG, *Determining nonnegative monotone set functions based on Sugeno's integral: an application of genetic algorithms*, Fuzzy Sets and Systems, **112**(2000), 155-164.